

# 2-Propanol 70% (V/V)

Lösung zum Auftragen auf die Haut  
und zur Bereitung von Umschlägen

## Haut- und Händedesinfektionsmittel

Zul.-Nr.: 1599.98.99

### Gebrauchsinformation

Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut; Kühlumschläge.

**Gegenanzeigen:** 2-Propanol 70% (V/V) ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Keine bekannt.

**Warnhinweise:** siehe Rückseite.

### Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:

Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit der Lösung eingerieben und 30 Sekunden lang feuchtgehalten. Zur chirurgischen Händedesinfektion werden Hände und Unterarme mit der Lösung eingerieben und 5 Minuten lang feuchtgehalten. Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 15 Sekunden lang feuchtgehalten. Zur Desinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 1 Minute lang feuchtgehalten. Zur Desinfektion von talgdrüsenreicher Haut wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 10 Minuten lang feuchtgehalten. Für Kühlumschläge ist die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden.

**Hinweise:** Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z.B. feuchte Haut, Verschmutzung der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. 2-Propanol 70% (V/V) wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet. Bei Fragen zur Anwendung bitte an Arzt oder Apotheker wenden.

**Nebenwirkungen:** Beim Einreiben der Haut mit 2-Propanol 70% (V/V) können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.

**B | BRAUN**

s. Rückseite →

836344 - 0322